

NIFEDIPRESS® RETARD.

NÃO USE MEDICAMENTO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ANTES DE USAR, OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Como todos os medicamentos, Nifedipress® retard pode provocar efeitos indesejáveis, como os seguintes:

- **Efeitos mais frequentes:** fadiga, inchaço das pernas, dores de cabeça, palpitações, dilatação dos vasos sanguíneos, enjoos, tonturas.

- **Efeitos pouco frequentes:** dores em geral, dor na barriga, dor no peito, mal-estar geral, pressão baixa, desmaio, aceleração das batidas do coração, prisão de ventre, diarreia, secura na boca, perturbações da digestão, vômitos, dores nas articulações, dores musculares, insônia, nervosismo, formigamentos, sonolência, vertigens, dificuldade para respirar, coceira, aparecimento de lesões ou vermelhidão da pele, suores, aumento da vontade de urinar, principalmente durante a noite.

- **Efeitos raros:** ventre dilatado, reação alérgica, reação de sensibilidade à luz, pressão baixa, gases intestinais, perturbações gastrintestinais, púrpura (aparecimento de manchas avermelhadas no corpo), diminuição da sensibilidade ao toque, urticária, alterações da visão, diminuição da visão.

- **Outros efeitos muito raros:** alterações nas gengivas, diminuição dos glóbulos brancos, aumento das glândulas mamárias no homem, eritromelalgia (situação caracterizada por dores, inchaço ou vermelhidão dos dedos das mãos e dos pés), inflamação da pele com descamação. Em doentes que fazem diálise e sofrem de pressão muito alta, pode ocorrer queda da pressão.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTES MEDICAMENTOS DE UMA SÓ VEZ?

Se alguém se intoxicar com uma dose excessiva de nifedipino, poderá apresentar os seguintes sintomas: perturbações da consciência, podendo entrar em coma, queda da pressão, alteração dos batimentos do coração, aumento do açúcar no sangue, desequilíbrio metabólico, falta de oxigênio no organismo, choque causado pelo mau funcionamento do coração e acúmulo de líquido nos pulmões. O tratamento deverá ser feito no hospital. No caso de superdose, contate seu médico ou o hospital mais próximo. Se possível, leve a embalagem com os comprimidos ao hospital.

ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar os comprimidos na sua embalagem original, dentro da cartela em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).

Proteger da luz e umidade, portanto só devem ser retirados da cartela na hora de tomar.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.
Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE: VIDE CARTUCHO
Registro no M.S. nº 1.0917.0034
Farm. Resp.: Dr. Jadir Vieira Junior - CRF - MG nº 10.681
SAC: 0800 0324087
www.medquimica.com

MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A.
RUA OTACILIO ESTEVES DA SILVA, 40 - GRANJAS BETÂNIA
CEP: 36047-400 - JUIZ DE FORA - MG - C.N.P.J. 17.875.154/0001-20
INDÚSTRIA BRASILEIRA



Cód. 3415-1

NIFEDIPRESS®

nifedipino

Comprimido Retard 20 mg

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

1 - Nome Genérico:

nifedipino

2 - Forma Farmacêutica e Apresentação:

2.1. Comprimido retard 20 mg em embalagem contendo 30 comprimidos revestidos.

2.2. Comprimido retard 20 mg em embalagem contendo 60 comprimidos revestidos.

2.3. Comprimido retard 20 mg em embalagem hospitalar contendo 500 comprimidos revestidos.

2.4. Comprimido retard 20 mg em embalagem hospitalar contendo 1000 comprimidos revestidos.

3 - Composição completa:

3.1 - Comprimido retard de 20 mg:

nifedipino.....20 mg
excipiente QSP.....1 comprimido revestido

(hipromelose K100LV e K4M, lactose mono-hidratada, álcool etílico, dióxido de silício, estearato de magnésio, hipromelose, macrogol, dióxido de titânio, corante óxido de ferro amarelo e água purificada).

USO ADULTO

VIA ORAL

INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Nifedipress® retard contém a substância ativa nifedipino. O nifedipino pertence a um grupo de substâncias conhecidas como antagonistas do cálcio. Sua atividade mais importante é dilatar os vasos sanguíneos, diminuindo a resistência à passagem do sangue. Assim, o sangue corre mais livre pelas veias e artérias, e isso faz diminuir a pressão. O tratamento da pressão alta diminui o risco de ocorrerem complicações no coração, no cérebro e nos vasos sanguíneos. O nifedipino serve também para tratar a dor no peito conhecida como angina do peito da doença coronária, porque essa substância ativa faz com que chegue mais sangue ao coração.

POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

Nifedipress® retard é indicado para o tratamento da pressão alta e da doença coronária.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

CONTRAINDICAÇÕES

Nifedipress® retard não deve ser usado nas situações abaixo:

- Alergia ao nifedipino ou a qualquer dos outros ingredientes do medicamento.

Caso haja dúvida com relação a ter tido ou não qualquer alergia devido ao nifedipino,

consulte seu médico.

- Em caso de choque de origem cardíaca.
- Paciente fazendo uso do antibiótico rifampicina, que é um medicamento que combate infecções.

- Durante a gravidez e a amamentação, exceto sob orientação médica. Informe ao seu médico caso ocorra gravidez ou início de amamentação durante o uso deste medicamento.

ESTE MEDICAMENTO É CONTRAINDICADO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

ADVERTÊNCIAS

Nifedipress® retard deve ser usado com precaução nos seguintes casos:

- Pacientes que sofrem de pressão muito baixa ou de mau funcionamento do coração, o que os médicos chamam de insuficiência cardíaca, ou pessoas que tenham estreitamento da artéria aorta, conhecido pelos médicos como estenose aórtica grave.
- Doença no fígado, pois neste caso poderá ser necessário reduzir a dose do medicamento.

PRECAUÇÕES

Nota: O nifedipino pode ser a causa de insucesso na fertilização artificial em homens que estejam tomando o medicamento e não apresentem outras causas que justifiquem esse insucesso.

Dirigir veículos e trabalhar com máquinas: Nifedipress® retard pode provocar reações de fadiga ou tonturas que podem alterar a capacidade de dirigir um veículo ou de trabalhar com máquinas. Essas reações poderão ser mais acentuadas no início do tratamento ou quando se ingerem bebidas alcoólicas.

INFORME AO MÉDICO O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS.

INFORME O SEU MÉDICO SE VOCÊ ESTIVER UTILIZANDO OU SE UTILIZOU RECENTEMENTE OUTROS MEDICAMENTOS, INCLUSIVE MEDICAMENTOS SEM RECEITA MÉDICA.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

A seguir mencionam-se alguns medicamentos que podem ter seu efeito alterado se administrados junto com Nifedipress® retard, ou que podem influenciar o efeito de Nifedipress® retard:

- Outros medicamentos para o tratamento da pressão alta podem aumentar o efeito de Nifedipress® retard.
- Medicamentos conhecidos como betabloqueadores, usados para tratar a pressão alta e para tratar algumas doenças do coração, podem provocar queda muito forte da pressão ou piorar o funcionamento do coração.
- **Digoxina:** usada para tratar doenças do coração, pode ter seu efeito aumentado.
- **Quinidina:** usada para o tratamento das alterações das batidas do coração pode ser necessário ajustar sua dose ao se iniciar ou terminar o tratamento com Nifedipress® retard.
- **Quinupristina/dalfopristina (antibióticos):** aumentam o efeito do nifedipino.
- **Cimetidina:** usada no tratamento de úlceras do estômago ou do intestino, aumenta o efeito

do nifedipino.

- **Rifampicina (antibiótico):** não se pode utilizar em conjunto com Nifedipress® retard, pois reduz o efeito do nifedipino.

- **Diltiazem:** usado no tratamento de certas doenças cardiovasculares, recomenda-se precaução na utilização em conjunto com nifedipino.

- **Fenitoína:** usada no tratamento de convulsões, reduz a eficácia do nifedipino.

- **Cisaprida:** usada no tratamento de certas doenças do estômago e do intestino, pode aumentar o efeito do nifedipino.

- Informe igualmente o seu médico caso esteja tomando medicamentos contendo:

- eritromicina (antibiótico);
- fluoxetina e nefazodona (antidepressivos);
- amprenavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir e saquinavir (antivirais);
- cetoconazol, itraconazol e fluconazol (antifúngicos);
- tacrolimo (usado em doentes transplantados);
- carbamazepina, fenobarbital e ácido valpróico (antiepilépticos).

Você não deve beber suco de toranja (grapefruit) enquanto estiver em tratamento com Nifedipress® retard, pois poderá ocorrer uma queda maior da pressão.

NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

ASPECTO FÍSICO

Nifedipress® retard 20 mg: comprimido redondo, biconvexo, revestido, de cor bege.

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

Nifedipress® retard comprimidos não tem cheiro.

DOSAGEM

Geralmente o médico receita 2 comprimidos de Nifedipress® retard por dia.

COMO USAR

Os comprimidos devem ser tomados com um intervalo de 12 horas, não devendo esse intervalo ser menor que 4 horas. O comprimido deve ser engolido com um pouco de líquido, podendo ser tomado com uma refeição ou não.

ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER PARTIDO OU MASTIGADO.

Nifedipress® retard destina-se a tratamentos prolongados. O seu médico dirá exatamente durante quanto tempo você deverá tomar Nifedipress® retard.

Se você se esqueceu de tomar uma ou mais doses, não tome outra para compensar a dose esquecida. Aguarde até o momento da próxima dose e continue normalmente o tratamento.

Fale com o seu médico se tiver impressão de que Nifedipress® retard é demasiado forte ou demasiado fraco. Não tome mais comprimidos do que aqueles que o médico receitou.

SIGAM A ORIENTAÇÃO DE SEU MÉDICO, RESPEITANDO SEMPRE OS HORÁRIOS, AS DOSES E A DURAÇÃO DO TRATAMENTO.

NÃO INTERROMPA O TRATAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. VERIFIQUE SEMPRE O PRAZO DE VALIDADE INDICADO NA EMBALAGEM DE